

## **Sinopharm Vakcina lakossági tájékoztató**

*2021. február 23.*

### **Sinopharm vakcina összetétele**

Inaktivált SARS-CoV-2 (Vero Cell) vakcina alumínium-hidroxid adjuvánszal.

### **Hogyan véd a vakcina?**

A vakcina elősegíti, hogy az immunrendszer (a szervezet természetes védelme) antitesteket és a vírus ellen ható vérsejteket termeljen, így nyújtson védelmet a COVID 19 ellen.

### **Kinél alkalmazható a védőoltás?**

A Sinopharm-vakcina 18 éves és idősebb személyeknél alkalmazható.

### **Okoz-e betegséget a vakcina?**

Az oltóanyag megbetegedést nem okozhat. A szövődeményekkel járó illetve súlyos lefolyású halállal végződő betegség kialakulása ellen nyújt védelmet.

### **Hány adag szükséges a védettséghez?**

A védettség kialakulásához 2 adag, 21-28 nap időközzel történő beadása szükséges.

Magyarországon 28 nap különbséget tartunk a 2 oltás beadása között.

### **Meddig tart a védettség?**

A vakcina által biztosított védelem ideje még nem ismert, meghatározása folyamatban van a jelenleg zajló klinikai vizsgálatok során.

### **Felcserélhetőség**

A Sinopharm-vakcina nem cserélhető fel más COVID-19 elleni oltóanyagokkal. Azoknak, akik már megkapták az első adag Sinopharm-vakcinát, meg kell kapniuk a második Sinopharm vakcinát is az oltási sorozat befejezéséhez.

### **Kaphat-e oltást, aki átesett COVID 19 betegségen?**

Azon személyek is olthatók a vakcinával, akik már átestek a betegségen és már abból meggyógyultak.

### **Szükséges-e antigén gyorsteszt végzése az oltás beadása előtt?**

Az oltás előtt nem szükséges antigén gyorsteszt.

### **Kaphat-e oltást, aki krónikus, alapbetegséggel rendelkezik?**

Bizonyos, elsősorban nem kezelt krónikus betegségek esetén a Sinopharm-vakcina beadása ellenjavallt. Amennyiben krónikus betegsége megfelelően kezelt, egyensúlyban tartott, megkaphatja az oltást.

Az oltóorvos dönt arról, hogy a Sinopharm-vakcina alkalmazható-e az oltandónál.

### **Beadható-e együtt másik védőoltással?**

A Sinopharm-vakcina más oltóanyaggal egyidejűleg nem adható be.

Másik védőoltás legalább 14 napos időközzel adható.

### **Várandósság**

Várandósság alatt az oltás ellenjavallt.

Várandósság a második oltás után minimum 2 hónappal tervezhető.

### **Szoptatás**

Szoptatás alatt az oltás ellenjavallt.

### **Hogyan történik az oltás?**

A védőoltás beadása oltási terv alapján történik a háziorvosoknál.

Az oltóorvos az oltandót az oltást megelőzően kikérdezi, szükséges mértékben megvizsgálja és az oltás beadásáról dönt.

### **Az oltás ellenjavallatai**

Akut lázas betegség

A Sinopharm-vakcina bármely összetevőjével szembeni súlyos allergiás reakció

A Sinopharm-vakcina első adagja után anafilaxiás reakcióval reagáló személy nem kaphatja meg a második adagot

Nem megfelelően egyensúlyban tartott krónikus betegség, vagy krónikus betegség akut fellángolása esetén, vagy kórtörténetben szerepelő túlérzékenység

Várandósság

Szoptatás

18 évnél fiatalabb életkor

### **Az oltás után kialakulhatnak-e mellékhatások (oltási reakciók)?**

Bármelyik védőoltás után jelentkezhet oltási reakció. Oltási reakciók lehetnek: érzékenység, fájdalom és duzzanat a beadás helyén, gyengeség, fejfájás, fájdalom, rossz közérzet, orrdugulás, orrfolyás, láz esetleg bőremelegség az injekció beadásának helyén, étvágytalanság, hányás, szédülés

### **Mivel lehet kezelni az oltási reakciót?**

A felsorolt reakciók enyhítésére fájdalom- és lázcsillapító gyógyszer alkalmazható. Ezek átmeneti reakciók, melyek általában beavatkozás nélkül is megszűnnek.

### **Hová lehet jelenteni oltási reakciót?**

Oltási reakciót lehet jelenteni az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek.

[https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszer\\_mellekhatas](https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszer_mellekhatas)

Oltási reakciót a nemzeti Népegészségügyi Központnak is lehet jelenteni.

[okne@nnk.gov.hu](mailto:okne@nnk.gov.hu)